7. Шпанёв А. М. Фитосанитарное состояние посевов озимой ржи на агроэкологическом стационаре Меньковского филиала Агрофизического научно-исследовательского института // Вестник защиты растений. – 2018, № 3. – С. 67-72.
8. Шпанёв А. М., Смук В. В. Поражение картофеля болезнями в Северо-Западном регионе // Современная микология в России Материалы III Международного микологического форума. – 2015. – С. 129-130.
9. Шпанёв А. М., Голубев С. В., Смук В. В. Вредители ярового рапса в Северо-Западном регионе // XV Съезд Русского энтомологического общества. – Материалы съезда. – 2017. – С. 550-551.

Сведения об авторах:

Фесенко Мария Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник,

Шпанёв Александр Михайлович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник,

Смук Василий Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

ФГБНУ АФИ, 195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский просп., д. 14

e-mail: fesenko@agrophys.ru

About the importance of agro-meteorological and anthropogenic factors in the cultivation of cultures of field crop rotation in north-west Russia

M. A. Fesenko, A. M. Shpanev, V. V. Smuk

Agrophysical Research Institute

In 2012-2016 in the agroecological stationary of the Menkovsky branch of Agrophysical Research Institute (Russia, North-West region) were conducted studies to assess the impact of plant protection products, mineral fertilizers and weather on the yield of spring barley, winter rye, potatoes and spring rapeseed. The goal is to identify the relationships, mutual influence and actions of each of the factors on productivity. Vegetation conditions determined 60% of potato yield, 59% of winter rye and 34% of spring barley. The priority of technogenic factors that determine productivity is different. The main indicator of grain productivity of winter rye (by 21% on average over the years of study) and spring barley (by 33%) is fertilizer. The yield of potatoes equally (by 9-10% on average over the years of study) can be determined either by mineral nutrition, or by the plant protection system. The effect of phytosanitary measures increases with the increase in mineral nutrition (from 60% to 73%). Rapeseed yields are less directly dependent on weather conditions (by 9%). The yield of rapeseed is determined by the sum of the action of the plant protection system (24%), fertilizers (15%) and weather (the contribution of the interaction of three factors – 28%).

Key words: *productivity, mineral fertilizers, plant protection products, potatoes, winter rye, spring barley, spring rape*

References

1. Ermakov E. I. Reguliruemaya agroekosistema v agrofizike i rastenievodstve // Ermakov E.I. Izbrannye trudy. – Sankt-Peterburg. – 2009. – С. 12-28.
2. Zavalin A. A., Pasyukov A. V. Azotnoe pitanie i prognoz kachestva zemnykh kultur. M.: Izdatel'stvo VNIIA, 2007. 208 s.
3. Ivanov A. I., Ivanova ZH. A., Vorob'yov V. A., Cyganova N. A. Agroekologicheskie posledstviya dlitel'nogo primeneniya deficit-nykh sistem udobreniya na horosho okul'turenykh dernovo-podzolistykh pochvah // Agrohimiya. – 2016, № 4. – С. 10-17.
4. Ivashchenko V. G., Pavlyushin V. A. Intensifikatsiya rastenievodstva i ekologo-produktsionnyy balans agroekosistem: snizhenie plodorodiya pochvy i fitosanitarnaya destabilizatsiya // Vestnik zashchity rastenij. – 2017, № 3 (93). – С. 5-16.
5. Rogozhnikova E. S., Shpanev A. M., Fesenko M. A. Vliyaniye udobreniy na porazheniye yarovogo yachmenya boleznyami v IV agroeklimaticheskoy zone Leningradskoy oblasti // Vestnik zashchity rastenij. – 2016, № 4. – С. 56-61.
6. Shpanev A. M. Fitosanitarnoye sostoyaniye posevov ozimoy rzhii na agroekologicheskom stacionare Men'kovskogo filiala Agrofizicheskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta // Vestnik zashchity rastenij. – 2018, № 3. – С. 67-72.
7. Shpanev A. M., Smuk V. V. Porazheniye kartofelya boleznyami v Severo-Zapadnom regione // Sovremennaya mikologiya v Rossii Mатериалы III Mezhdunarodnogo mikologicheskogo foruma. – 2015. – С. 129-130.
8. Shpanev A. M., Golubev S. V., Smuk V. V. Vrediteli yarovogo rapsa v Severo-Zapadnom regione // XV S'ezd Russkogo entomologicheskogo obshchestva. – Materialy s'ezda. – 2017. – С. 550-551.

Поступление/Received: 12.05.2020

Принято/Accepted: 31.05.2020

УДК 631.51

DOI: 10.37574/2658-7963-2020-1-32-37

Обработка почвы и ее влияние на содержание основных элементов питания

Кузина Е. В.

Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению влияния способов основной обработки почвы и удобрений на динамику поступления доступных форм NPK в 0-30 см слое почвы при сплошном и локальном размещении пожнивных остатков. Установлено, что на естественном фоне лучшей нитрификационной способностью обладала гребнекульсная обработка почвы с почвозуглублением, при которой средневзвешенная величина содержания нитратного азота

составила 3,94 мг/100 г, что на 37% больше, чем при нулевой, на 45% – при мелкой и на 57-58% – при обычной отвальной и безотвальной обработке. Вспашка улучшала условия фосфорного и калийного питания растений на 14-27% и 6-11% по сравнению с другими обработками. При внесении в почву $N_{30}P_{30}K_{30}$ и $N_{60}P_{60}K_{60}$ содержание нитратного азота увеличивалось на 48 и 84%, фосфора и калия на 6 и 17% по сравнению с неудобренным фоном.

Ключевые слова: обработка почвы, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, урожайность

В настоящее время с достаточной определенностью установлено, что обработка, нарушая динамическое равновесие в экологической системе почва-растение-атмосфера и изменяя биогеохимический круговорот веществ и энергии в биосфере, в большинстве случаев приводит к снижению плодородия и деградированию почв [1, 2, 3]. В то же время обработка остается важнейшим агротехническим звеном в системе земледелия, определяющим водно-воздушное и минеральное питание растений и существенно влияющим на урожайность полевых культур [4, 5]. Поэтому перед современным земледелием остро стоит проблема уменьшения неблагоприятного влияния обработки на почвенное плодородие. Для этого необходимо углубленное и всестороннее изучение происходящих в почве биологических процессов и поступление доступных элементов питания для растений под воздействием различных способов обработки почвы в сочетании с другими антропогенными факторами, чтобы научиться активно регулировать и управлять почвенными процессами [6, 7].

Цель наших исследований – определение влияния способов основной обработки почвы и доз минеральных удобрений на питательный режим почвы при сплошном и локальном размещении пожнивных остатков.

Материал и методы

Исследования проводились в 2012-2018 годах на опытных полях Ульяновского НИИСХ в зернопаровом севообороте со следующим чередованием культур; 1 – черный пар; 2 – озимая пшеница; 3 – яровая пшеница; 4 – горчица (сидерат); 5 – озимая пшеница; 6 – ячмень. В опыте предусматривалось три уровня минерального питания ($N_0P_0K_0$; $N_{30}P_{30}K_{30}$; $N_{60}P_{60}K_{60}$). Схема опыта включала в себя 7 вариантов обработки почвы: отвальная (вспашка на 20-22 см ПАН-4-35), безотвальная – (стойки СИБИМЭ на 20-22 см), мелкая гребнекулисная – (ОП-3С на 10-12 см), мелкая мульчирующая обработка почвы (ОПО-4,25, КПИР-3,6 на 10-12 см), без основной осенней обработки, лущение со стернеукладчиком (ОП-3С на 6-8 см), гребнекулисная – (ОП-3СШ с почвоуглублением до 30-32 см).

За контроль в опытах была принята отвальная система основной обработки почвы. Предпосевная и послепосевная обработка почвы на вариантах опыта состояла из предпосевной культивации на глубину заделки семян (ОПО-4,25) и послепосевного прикатывания почвы (ЗККШ-6А). Посев проводили сеялкой СЗ-3,6.

Наблюдения, определения и учеты проведены по общепринятым методикам: содержание подвижных форм фосфора и калия – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91); нитратного азота – дисульфифеноловым методом Грандваль-Ляжу (ГОСТ 26951-86). Содержание биогенных элементов $N-NO_3$, P_2O_5 , K_2O определяли ежегодно в почвенных образцах, отобранных в пахотном слое буром Малькова в сроки: весной (посев – всходы), в фазу колошения и перед уборкой культур, в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см.

Результаты и их обсуждение

Наши исследования показали, что основная обработка почвы, являясь мощным фактором антропогенного воздействия на строение пахотного слоя, изменяла водно-физические свойства почвы и определяла направленность биологических процессов и мобилизацию питательных веществ.

Было отмечено неоднозначное влияние способов обработки почвы и удобрений на содержание доступных форм NPK в пахотном слое.

Количественное содержание нитратного азота в течение вегетационного периода было весьма динамичным и имело широкие интервалы колебаний. Весной на всех фонах удобренности были достигнуты его максимальные значения. В фазу колошения на естественном фоне содержание азота в почве снижалось на 9%, во время уборки – на 13%. На фонах $N_{30}P_{30}K_{30}$ и $N_{60}P_{60}K_{60}$ снижение содержания азота в фазу колошения составило 6 и 2%, при уборке – 15 и 36% по сравнению с весенними показателями (таблица 1).

При проведении гребнекулисной обработки создавались локальные минерализованные полосы, в чередовании с которыми из стерни и растительных остатков формировались водопоглощающие элементы и гребнестерневые кулисы, в которых

стерня и пожнивные остатки размещались концентрированно и частично перемешивались с почвой, что давало возможность

начать разложение пожнивных остатков сразу после проведения обработки.

Таблица 1 – Изменение содержания элементов минерального питания под культурами зернопарового севооборота, в зависимости от способов обработки почвы и уровня удобренности, мг/100 г почвы (среднее за 2012-2018 гг.)

Варианты*	NO ₃			P ₂ O ₅			K ₂ O		
	весной	в фазу колошения	при уборке	весной	в фазу колошения	при уборке	весной	в фазу колошения	при уборке
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀									
1	2,71	2,19	2,72	28,6	29,4	30,3	8,34	9,70	9,40
2	2,25	2,65	2,58	24,6	24,4	26,6	7,79	9,05	9,51
3	4,07	3,16	2,76	22,9	22,9	23,2	7,21	8,69	9,30
4	2,92	2,53	2,68	23,0	22,2	24,3	7,17	8,75	8,87
5	3,45	2,61	2,59	22,7	22,2	19,8	7,46	8,75	8,21
6	3,58	3,59	3,19	25,0	24,2	23,5	7,47	8,82	9,22
7	4,07	4,26	3,48	23,8	22,9	20,8	7,59	8,53	8,25
Среднее	3,29	3,0	2,86	24,4	24,0	24,1	7,57	8,89	8,96
N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀									
1	4,62	3,46	4,48	29,0	25,5	28,0	8,30	8,86	10,02
2	4,25	4,34	3,57	26,3	25,2	26,6	8,29	9,30	9,43
3	5,05	4,57	3,82	25,8	25,9	23,5	8,38	9,85	9,13
4	4,95	3,32	3,65	25,0	23,9	22,4	7,97	8,94	8,14
5	4,50	5,45	3,01	26,3	24,3	23,1	8,21	8,99	8,75
6	4,95	5,0	2,97	28,6	27,9	25,7	8,76	10,32	9,54
7	5,88	5,64	4,32	26,6	25,0	23,7	7,94	10,12	8,97
Среднее	4,88	4,56	4,15	26,8	25,4	24,7	8,24	9,48	9,14
N ₃₀ P ₃₀ K ₆₀									
1	5,52	5,96	4,04	31,1	29,7	31,1	9,18	9,53	9,63
2	6,05	7,29	4,14	33,0	32,7	30,8	10,99	12,09	10,73
3	6,07	6,62	3,92	34,9	27,5	26,8	10,09	9,81	9,87
4	5,97	6,68	4,78	29,4	27,5	28,7	9,33	10,77	10,97
5	5,96	4,99	2,80	27,6	24,9	25,4	8,37	9,59	9,54
6	6,90	5,96	4,53	28,8	26,2	24,7	8,48	10,77	9,76
7	8,22	7,90	4,62	26,8	27,9	22,5	9,37	9,63	9,38
Среднее	6,41	6,31	4,12	30,2	28,0	27,1	9,39	10,31	9,96

* Цифрами обозначены способы обработки почвы: 1 – отвальная на 20-22 см; 2 – безотвальная на 20-22 см; 3 – гребнекульная на 10-12 см; 4 – мелкая на 10-12 см; 5 – без основной осенней обработки; 6 – лущение со стернеукладчиком на 6-8 см; 7 – гребнекульная с почвоуглублением до 30-32 см

Кроме того, на пространстве между кулисами, лишенном большей части свежих негумифицированных остатков, создавались лучшие условия для процессов минерализации. В связи с этим, в ответственные периоды роста и развития культурных растений, технологии с гребнекульной обработкой по содержанию нитратного азота имели устойчивое преимущество в сравнении со вспашкой. Весной, в почве вариантов с гребнекульной обработкой с почвоуглублением, нитратного азота содержалось на 50%, в фазу колошения – на 94%, при уборке – на 28% больше, чем на вспашке. Средневзвешенная величина содержания нитратного азота на этом варианте обработки составила 3,94 мг/100 г, что на 45 % больше, чем при поверхностном размещении стерни с мелкой и на 58% – с глубокой безотвальной обработкой. При отказе от осенней основной обработки снижение составило 37%.

На вариантах с бесплужной обработкой, при внесении удобрений, за счет активизации микробиологических процессов улучшались и условия азотного питания рас-

тений по сравнению со вспашкой. При определении весной и в фазу колошения, на фоне N₃₀P₃₀K₃₀ нитрификационная способность на этих вариантах была выше соответственно на 30-33%, на фоне N₆₀P₆₀K₆₀ на 63-29%.

При обобщении всех данных за годы исследований по срокам определения и фонам удобренности установлено, что нитратного азота в почве на вариантах со вспашкой содержалось 3,97 мг/100 г. При отказе от основной осенней обработки и замене вспашки мелкой обработкой отмечалось незначительное снижение изучаемого элемента на 1-4%. На остальных вариантах образование нитратного азота шло интенсивнее, чем на вспашке. Преимущество на варианте с безотвальной обработкой составило 4%, на вариантах с мелкой гребнекульной обработкой и лущения со стернеукладчиком – 12-14%. Гребнекульная обработка с почвоуглублением привела к более существенному повышению – на 35%.

Внесение минеральных удобрений под предпосевную культивацию в дозе

$N_{30}P_{30}K_{30}$ и $N_{60}P_{60}K_{60}$ стимулировало мобилизацию почвенного азота и улучшало условия питания растений. На удобренных фонах наметилась тенденция к увеличению его показателей на 48-84% по сравнению с фоном без применения удобрений.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 30-ти сантиметровой слой почвы под культурами зернопарового севооборота отличался низкой обеспеченностью нитратным азотом, очень высоким содержанием фосфора (более 20 мг/100 г почвы) и повышенным содержанием обменного калия (8,1-12,0 мг/100 г почвы). Во все годы исследований динамика подвижного фосфора была схожей, т.е. содержание этого элемента питания уменьшалось по всем вариантам опыта от начала вегетации растений к моменту их уборки на 6-7%, а содержание обменного калия, напротив, повышалось на 14-11%.

Наиболее устойчивая оптимизация фосфатного режима почвы достигалась при проведении вспашки, где на естественном фоне содержание фосфатов варьировало от 28,6 до 30,3 мг/100 г в зависимости от срока определения, что превысило его содержание в среднем на 14-27% по сравнению с беспашотными вариантами. На фоне $N_{30}P_{30}K_{30}$ весной небольшое преимущество в 9% перед остальными вариантами имела вспашка, в фазу колошения содержание подвижного фосфора на вспашке и беспашотных вариантах выравнивалось, а в фазу полной спелости культур наиболее благоприятные условия фосфорного питания растений вновь складывались на вспашке. На фоне $N_{60}P_{60}K_{60}$ были достигнуты максимальные значения изучаемого показателя, весной преимуществом в 6-12% перед вспашкой обладали варианты с обычной безотвальной и мелкой гребнекулисной обработкой, в колошение и в фазу полной спелости сохранялась та же зависимость по изучаемым вариантам, как и при внесении $N_{30}P_{30}K_{30}$.

Внесение фосфора в составе минеральных удобрений в дозе P_{30} и P_{60} позволило увеличить содержание доступных соединений этого элемента в среднем на 6 и 17%. При этом по вспашке увеличение составило 0-4%, по безотвальной обработке на одинаковую со вспашкой глубину на 3-28%, по мелкой и «нулевой» 2-23% и 14-20%, по мелкой гребнекулисной и гребнекулисной с почвоуглублением на 9-29% и 11-14% относительно естественного фона.

Полученные нами данные по калийному режиму почвы показали, что весной

на естественном фоне бесплужные обработки снижали содержание обменного калия в среднем на 9%, а на фоне $N_{60}P_{60}K_{60}$ увеличивали на 6% по сравнению со вспашкой. Весной при внесении $N_{30}P_{30}K_{30}$ разница между вспашкой и бесплужными обработками не превышала 1%. В последующие сроки определения на этом фоне проявилась положительная тенденция изменения калийного режима почвы на бесплужных обработках относительно вспашки на 8%. К фазе полной спелости культур преимущество вновь перешло к вспашке и составило 12%.

Внесение минеральных удобрений вызывало увеличение содержания обменного калия в почве в среднем на 6-17% по сравнению с первоначальными значениями. Вариант безотвальной обработки на 20-22 см характеризовался более существенной положительной динамикой обменного калия на удобренных фонах. Это изменило обеспеченность калием с 8,78 мг/100 на фоне без удобрений до 9,0 и 11,27 мг/100 на фоне внесения $N_{30}P_{30}K_{30}$ и $N_{60}P_{60}K_{60}$ или на 2-28% по сравнению с естественным фоном и на 3-25% по сравнению со вспашкой. Здесь же на фоне $N_{60}P_{60}K_{60}$ было установлено максимальное содержание доступных соединений этого элемента.

Эффективность любых агротехнических приемов, в конечном итоге, оценивается выходом продукции с гектара пашни. Как показали исследования, наибольший выход зерна с 1 гектара севооборотной площади был получен на вариантах с мелкой гребнекулисной обработкой почвы и гребнекулисной с почвоуглублением до 30-32 см. Наибольшая урожайность по данным способам обработки наблюдалась на протяжении всех лет исследований по всем культурам севооборота, чему способствовали лучшая обеспеченность нитратным азотом в сочетании с оптимальным увлажнением метрового слоя почвы на этих вариантах.

Результаты статистической обработки полученного материала подтвердили тесную зависимость урожайности озимых и яровых культур по вариантам опыта от увлажненности почвы и обеспеченности минеральным азотом, о чем свидетельствуют коэффициенты корреляционной связи между этими показателями, которые в среднем составили соответственно 0,51-0,50 и 0,72-0,64 (таблица 2).

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между урожайностью зерновых культур и свойствами почвы

Свойства почвы	Урожайность озимой пшеницы по агрофонам				Урожайность яровой пшеницы и ячменя по агрофонам			
	N ₀ P ₀ K ₀	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	среднее	N ₀ P ₀ K ₀	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	среднее
Влага в почве, мм	0,42	0,54	0,57	0,51	0,82	0,78	0,57	0,72
NO ₃ , мг/100 г почвы	0,59	0,62	0,28	0,50	0,65	0,65	0,63	0,64
P ₂ O ₅ мг/100 г почвы	0,17	0,24	0,14	0,18	0,11	0,12	0,07	0,10
K ₂ O мг/100 г почвы	0,16	0,14	0,08	0,13	0,15	0,09	0,12	0,12

Средняя урожайность зерна, по гребнекулисным обработкам составила 3,29-3,33 т/га, что на 0,28-0,32 т/га больше, чем по вспашке. К тому же на этих вариантах уровень урожайности, полученный без применения удобрений, был выше, чем на вспашке с внесением N₃₀P₃₀K₃₀ на 0,13-0,11 т/га. Далее в убывающей последовательности, шли безотвальная, поверхностная (лушение со стернеукладчиком) и мелкая мульчирующая обработки, где по сравнению с контролем прибавки урожайности были не достоверными и составили соответственно 0,16 и 0,06 т/га, что не превышало значения НСР (0,21 т/га).

Урожайность большинства культур при отказе от основной осенней обработки уменьшалась: яровой пшеницы на 0,23 т/га, озимой пшеницы по сидеральному пару – на 0,19 т/га, ячменя – на 0,36 т/га или на 9-5-12% по сравнению с контролем. В целом

продуктивность севооборота на этом варианте снижалась на 0,17 т/га по сравнению с контролем и на 0,45-0,49 т/га по сравнению с гребнекулисными обработками.

Выводы

Сравнительная оценка влияния способов обработки почвы на пищевой режим дает основание сделать заключение, что содержание в пахотном слое подвижных форм фосфора и калия не оказывало заметного влияния на снижение урожайности изучаемых культур, так как их содержание в почве было близким к оптимальным значениям. Главным критерием выбора адекватной местным условиям обработки почвы является улучшение накопления минерального азота, способность её влиять на улучшение водного режима и устранение других неблагоприятных факторов получения высоких урожаев.

Список литературы

1. Баздырев Г. И. Возможности и проблемы минимализации обработки почвы при длительном ее использовании / И. Г. Баздырев, И. А. Заверткин // Известия ТСХА. – М., 2008. – № 4. – С. 4-16.
2. Карпович К. И., Немцев С. Н. Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур в черноземной лесостепи Ульяновской области // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2004. – № 6. – С. 30-33.
3. Казаков Г. И. Почвозащитная обработка почвы в Среднем Поволжье / Г.И. Казаков, В.А. Корчагин // Земледелие. – 2009. – № 1. – С. 26-28.
4. Кирдин В. Ф. Воспроизводство плодородия и минимализация обработки почвы в Нечерноземной зоне / В. Ф. Кирдин // Земледелие. – 2007. – № 2. – С. 21-22.
5. Черкасов Г. Н., Дубовик Е. В., Дубовик Д. В., Казанцев С. И. Плодородие чернозема типичного при минимизации основной обработки // Земледелие. – 2012. – №4. – С. 23-25.
6. Кузина Е. В. Преимущества гребнекулисной обработки почвы при возделывании зерновых культур/ Кузина Е. В., Шаббаев А. И. // Научная жизнь 2015. № 1. С. 61-69.
7. Никитин С. Н., Куликова А. Х., Карпов А. В. Влияние удобрений на урожайность и биоэнергетическую эффективность технологий возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 4 (32). – С. 45-51.

Сведения об авторах:

Кузина Елена Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лаборатории
Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ, 433315, Россия, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19

e-mail: elena.kuzina@autorambler.ru

Tillage and its impact on the content of basic nutrients

E. V. Kuzina

Ulyanovsk research Institute of agriculture-branch of SamSC RAS

The article presents the results of the research work on the influence of the methods of the main tillage of soil and fertilizers on the dynamics of the available forms of NPK in 0-30 cm layer of soil at the continuous and local placement of stubble residues. It has been established that on the natural background, the best nitrification ability was provided by comb-back tillage with soil deepening, in which the weighted average value of the nitrate nitrogen content was 3,94 mg per 100 g, which is 37% more than at zero, 45% for shallow and 57-

58% for conventional dump and non-dump treatment. Plowing improved the conditions of phosphorus and potash nutrition of the studied plants by 14-27% and 6-11% compared to other treatments. When $N_{30}P_{30}K_{30}$ and $N_{60}P_{60}K_{60}$ were applied to soil, the content of nitrate nitrogen increased by 48 and 84%, phosphorus and potassium by 6 and 17% compared to the unfertilized background.

Key words: tillage, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, productivity

References

1. Bazdyrev G. I. Vozmozhnosti i problemy minimalizacii obrabotki pochvy pri dlitel'nom ee ispol'zovanii / I. G. Bazdyrev, I. A. Zavertkin // Izvestiya TSKHA. – M., 2008. – № 4. – S. 4-16.
2. Karpovich K. I., Nemcev S. N. Resursosberegayushchie tekhnologii vozdeleyvaniya sel'skohozyajstvennykh kul'tur v chernozemnoj lesostepi Ulyanovskoj oblasti // Doklady Rossijskoj akademii sel'skohozyajstvennykh nauk. – 2004. – № 6. – S. 30-33.
3. Kazakov G. I. Pochvozashchitnaya obrabotka pochvy v Srednem Povolzh'e / G. I. Kazakov, V. A. Korchagin // Zemle-delie. – 2009. – № 1. – S. 26-28.
4. Kirdin V. F. Vospriizvodstvo plodorodija i minimalizaciya obrabotki pochvy v Nechernozemnoj zone / V. F. Kirdin // Zemledelie. – 2007. – № 2. – S. 21-22.
5. SHERKASOV G. N., DUBOVIK E. V., DUBOVIK D. V., KAZANCEV S. I. Plodorodie chernozema tipichnogo pri minimi-zacii osnovnoj obrabotki // Zemledelie. – 2012. – № 4. – S. 23-25.
6. Kuzina E. V. Preimushchestva grebnekulisnoj obrabotki pochvy pri vozdeleyvanii zernovykh kul'tur / E. V. Kuzina, A. I. SHabaev // Nauchnaya zhizn' 2015. № 1. S. 61-69.
7. Nikitin S. N., Kulikova A. H., Karpov A. V. Vliyanie udobrenij na urozhajnost' i bioenergeticheskuyu ef-fektivnost' tekhnologii vozdeleyvaniya sel'skohozyajstvennykh kul'tur v sevooborote // Vestnik Ulyanovskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii. – 2015. – № 4 (32). – S. 45-51.

Поступление/Received: 30.04.2020

Принято/Accepted: 30.05.2020

УДК 635.262:631.532.2

DOI: 10.37574/2658-7963-2020-1-37-40

Сортовые различия по минеральному составу и пищевой ценности лука порея

¹Середин Т. М., ¹Голубкина Н. А., ²Шумилина В. В., ²Соловьева А. Е.,
¹Шевченко Т. Е., ¹Марчева М. М.

¹ ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»

² ФГБНУ ФИЦ ВНИИГР им. Н.И. Вавилова

Лук порей (*Allium porrum* L.) – ценная овощная культура, богатая органическими кислотами, минеральными солями, особенно калием и кальцием, витаминами, широко используется в диетическом питании. Лук порей имеет специфический запах, придающий аромат различным блюдам. Эфирные масла также обуславливают бактерицидное, фитонцидное и антибактериальное действие. Свежий лук порей является хорошим источником флавоноидов, полисахаридов и глюкозинолатов, а также целого ряда органических соединений серы, в частности, S-алкенил-цистеин-сульфоксидов, определяющих богатый аромат растения, мощные антиоксидантные свойства и высокую биологическую активность растения. В настоящих исследованиях приведены данные по содержанию эссенциальных элементов, которые содержатся в отбеленной части стебля лука порея. Исследования проводили на опытных полях Федерального научного центра овощеводства (Московская область, Одинцовский район). В работе исследованы межсортовые различия в аккумуляции основных макро- и микроэлементов тремя сортами лука порея, отечественной и зарубежной селекции. Установлено, что лук порей является хорошим источником не только калия и железа для человека, но также и бора. Элементы, в среднем, по сортам лука порея распределились следующим образом в порядке убывания: $K > Ca > P > Mg > Na > Fe > Al > Sr > B > Zn > Si > Mn > Cu > Ni > Pb > V > Li > Sn > Cd > Co > I > As$. Одинаковые условия выращивания растений лука порея указывают на то, что межсортовые различия по накоплению микроэлементов связаны с генетическими особенностями исследуемых сортов. Сорт Голиаф по сравнению с сортом Казимир накапливает достоверно больше калия, что делает первый сорт особенно значимым для восполнения потребности человека в калии.

Ключевые слова: лук порей, ложный стебель, микроэлементы, пищевая ценность

Положительное влияние многих из элементов на здоровье человека вызывает неослабевающий интерес к элементному составу овощных культур и, в частности, лука порея [1, 2, 3]. Исследования содержания отдельных элементов в луке порее позволили выявить, что это растение способно накапливать высокие концентрации калия и железа. Однако, до настоящего времени

исследования ограничивались в основном лишь макроэлементами и небольшим количеством микроэлементов (K, Ca, P, Na, Mg, Fe, Zn, Cu, Se), не позволяя судить о полном элементном профиле растения [7, 8, 9].

Пищевая ценность лука порея оказывается значимой для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (калий), анемией (железо) и заболеваниями